



IES. ZADÍN VERGELES

PLANTAS DE LA ALHAMBRA

IRENE ESPIÑEIRA CARMONA

1. CASTAÑO LOCO

Aesculus hippocastanum L.

- Árbol caducifolio.
- Hojas opuestas palmatipartidas, de 5-7 folíolos desiguales.
- Flores blancas con una mancha rosada en la base.
- Fruto cápsula carnosa, esférica, con espinas y dehiscente.
- Florece desde primeros de abril hasta mediados de mayo.



2- MADROÑO

Arbutus unedo L.


- Arbusto perennifolio.
- Corteza muy escamosa.
- Hojas alternas elíptico-oblongas a elíptico-obovadas.
- Flores en ramilletes terminales algo péndulos y de color blanco-crema.
- Fruto en valla esférica cubierta por escamas y de color rojo.
- Florece desde primeros de octubre a primeros de diciembre.



3. BUGANVILLA

Bougainvillea glabra Choisy

- Arbusto trepador perennifolio.
- Ramas largas armadas con espinas rectas.
- Hojas alternas ovales.
- Inflorescencia formada por tres hojas fasciculadas púrpuras.
- Flores con cinco lóbulos.
- Florece principalmente de mayo a noviembre.



4. BOJ

Buxus sempervirens L.

- Se emplea para formar setos.
- Arbusto perennifolio muy ramificado.
- Hojas opuestas, coriáceas de ovales a oblongo-lanceoladas.
- Flores de color verdoso, reunidas en glomérulos axilares, con una sola flor femenina central y las masculinas a su alrededor.
- Fruto en cápsula con tres cuernecitos estilares de menor longitud que la mitad de la cápsula verde al principio, marrón en la madurez.
- Florece desde finales de febrero hasta mediados de abril.



5. BIGNONIA

Campsis radicans L.

- Arbusto caducifolio, trepador, de hasta 10m.
- Hojas opuestas imparipinnadas oval-oblongas serradas.
- Flores con corola en forma de embudo, color rojo-anaranjado.
- Frutos en cápsula bivalva y cilíndrico.
- Florece desde principios de junio hasta finales de septiembre.



6. ALMEZ

Celtis australis L.

- Árbol caducifolio.
- 25 m de altura, robusto y con el tronco recto, corteza lisa y grisácea.
- Hojas alternas oval-lanceoladas, asimétricas, redondeadas en la base y serradas.
- Flores de pequeño tamaño hermafroditas o masculinas.
- Fruto en drupa, con poca carne, verde-amarillenta, negra en la madurez.
- Florece a primeros o mediados de abril.



7. ÁRBOL DEL AMOR

Cercis siliquastrum L.

- Árbol caducifolio de hasta 10 m.
- Tronco irregular, de corteza rugosa y resquebrajada, pardo-negrizca.
- Hojas alternas y orbiculares.
- Las flores salen directamente de las ramas o tronco. La corola es de color rosado y tiene los tres pétalos superiores más cortos que los dos inferiores.
- Los frutos son legumbres aplanadas de color pardo-rojizo.
- Florece en Abril.



8. MEMBRILLERO DEL JAPÓN

Chaenomeles spaciosa

- Arbusto caducifolio de hasta 3 m con ramas espinosas que se entrelazan.
- Hojas alternas oval-oblongas y serradas.
- Flores rojas, en grupos de dos o tres, de 5 cm de diámetro. Pétalos redondeados de aspecto céreo; estambres numerosos.
- Fruto en pomo, de hasta 5 cm de color amarillo-verdoso.
- Florece desde mediados de enero hasta mediados de abril.



9. MACASAR

Chimonanthus praecox L.

- Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura.
- Hojas opuestas, ovado-lanceoladas, enteras, redondeadas atenuadas en la base.
- Flores campanuladas, con piezas externas de color amarillo crema con estrías pardo-púrpuras internas.
- Fruto en forma de botella, algo arqueado y pubescente.
- Florece desde primeros de enero hasta mediados de marzo.



10. NARANJO AMARGO

Citrus x aurantium L.

- Arbolillo perennifolio, de hasta 8 m de alto.
- Corteza verdosa.
- Hojas alternas, elípticas o lanceoladas.
- Flores blancas muy olorosas, solitarias o en pequeños grupos axilares; corola con cinco pétalos carnosos, con textura cérea.
- Fruto carnoso, en hesperidio, con la corteza naranja en la madurez, rugosa y con vesículas glandulares aromáticas.
- Florece desde mediados de abril hasta finales de mayo.

