

TEST UNIDAD 3 Y UNIDAD 4

C.E.PER. ALPUJARRA

1. La mandíbula es:

- a) Un hueso único, inmóvil gracias a la articulación que establece con el cráneo y que se denomina articulación témporo-mandibular.
- b) Un hueso único, móvil gracias a la articulación que establece con el cráneo y que se denomina articulación témporo-mandibular.
- c) Un hueso único, móvil gracias a la articulación que establece con el cráneo y que se denomina articulación témporo-mandibular.

2. La articulación témporo-mandibular trata de:

- a) Una articulación móvil que está formada por dos superficies articulares como son la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo de la mandíbula.
- b) Una articulación móvil que está formada sólo por una superficie articular.
- c) Una articulación inmóvil que está formada por dos superficies articulares como son la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo de la mandíbula.

3. La pared posterior de la cavidad bucal está formada por:

- a) El velo del paladar y el istmo de las fauces.
- b) La bóveda palatina, que a su vez está formada por dos estructuras: el paladar duro y el paladar blando, que se sitúa por detrás del duro.
- c) Los labios.

TEST UNIDAD 3 Y UNIDAD 4

C.E.PER. ALPUJARRA

4. La pared inferior de la cavidad bucal está formada por:

- a) La bóveda palatina, que a su vez está formada por dos estructuras: el paladar duro y el paladar blando, que se sitúa por detrás del duro.
- b) El velo del paladar y el istmo de las fauces.
- c) La lengua y el suelo de la boca.

5. La pulpa:

- a) No forma parte propiamente del diente, pero es el que lo mantiene unido al hueso alveolar.
- b) Es el único lugar del diente donde aparecen células.
- c) Es el tejido más externo de la corona dentaria.

6. Los tubérculos supernumerarios son:

- a) Excavaciones irregulares más profundas que los surcos.
- b) Estructuras con forma de pirámide cuadrangular, con su base soldada al cuerpo del diente.
- c) Son prominencias o pequeñas cúspides ubicadas en la corona dentaria, agregados a las estructuras anatómicas normales.

7. Los test colorimétricos, usados para el diagnóstico de la caries dental, son:

- a) Sustancias que tiñen de color a la dentina desmineralizada y, por lo tanto, destacan zonas donde hay acumulados gran cantidad de gérmenes y que resultan más favorables a desarrollar caries.
- b) Aparatos electrónicos que detectan zonas de desmineralización del esmalte.
- c) Una potente fuente de luz.

TEST UNIDAD 3 Y UNIDAD 4

C.E.PER. ALPUJARRA

8. Las caries de cuello:

- a) Aparecen en el límite amelo cementario de los dientes y, por lo tanto, en las cercanías del margen gingival.
- b) Aparecen en vestibular y palatino o lingual de la pieza.
- c) Se dan por debajo del punto de contacto de las piezas dentarias.

9. El bruxismo excéntrico se refiere a:

- a) Cuando se aprietan en un punto determinado ambas arcadas dentarias.
- b) La destrucción del borde incisal, que suele ser uno de los primeros signos de la enfermedad, al desarrollar movimientos parafuncionales más amplios que interesan en su recorrido a los dientes.
- c) Cuando se produce durante el sueño.

10. La subluxación consiste en:

- a) La lesión de las estructuras que rodean al diente sin movilidad ni desplazamiento del mismo.
- b) El desplazamiento parcial del diente en el alveolo.
- c) La lesión de las estructuras de sostén que provoca que el diente este flojo.

TEST UNIDAD 3 Y UNIDAD 4

C.E.PER. ALPUJARRA

RESPUESTAS

1.B

2.A

3.A

4.C

5.B

6.C

7.A

8.A

9.B

10.C