

RECURSOS Y BIBLIOTECA

Informe "Violencia contra la mujer. Respuesta del sector de la salud" (OMS, 2014)

El informe detalla que las agresiones físicas y sexuales afectan principalmente a mujeres que tienen entre 15 y 49 años de edad. La prevalencia de este problema varía de país en país y afecta desde un 15% hasta un 71% de la población femenina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual. Según el informe "Violencia contra la mujer", la forma más común de violencia en contra de ellas es la que ejerce su pareja.

Fuente: [OMS](#)



Violencia contra la mujer

Respuesta del sector de la salud



1

de cada

3

mujeres sufre

violencia física o sexual

infligida por la pareja en algún
momento de su vida.



Organización
Mundial de la Salud

La violencia contra la mujer adopta muchas formas, entre ellas las siguientes:



La forma más habitual de violencia sufrida por las mujeres es la **violencia de pareja.**



La violencia contra la mujer es un **fenómeno generalizado.**

Ocurre en todos los países

... pero la prevalencia varía de un país a otro.

La prevalencia varía también dentro de cada país.

Estudios realizados en **diferentes países** demuestran que el porcentaje de mujeres 15 a 49 años que han **sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja** a lo largo de su vida se sitúa entre el

15% y el **71%**

Esas diferencias muestran que la violencia contra la mujer es un problema **prevenible.**

La violencia contra la mujer repercute gravemente en su salud.

Muerte



Lesiones físicas



Embarazos no deseados, abortos inducidos



Infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH



Depresión, trastorno de estrés postraumático



Uso nocivo de tabaco, drogas y alcohol



£ € \$ ¥

Impacto económico

ريال ₪ ₪ ₪

El costo económico de la violencia de pareja y sexual para los países es muy elevado. Ello incluye la provisión de **servicios de salud, sociales y jurídicos**, así como los ingresos perdidos.

La violencia contra la mujer **afecta a toda la familia.**

Los niños expuestos a violencia infligida por la pareja en el hogar tienen más probabilidades de:



- Ser víctimas de maltrato
- No recibir atención sanitaria
- Tener problemas de conducta, emocionales y escolares

En la adolescencia, tienden más a:



- Usar alcohol y drogas de forma nociva
- Fumar
- Tener relaciones sexuales sin protección

Los **adultos** que se criaron con violencia en el hogar presentan una mayor tendencia a **cometer o sufrir actos de violencia infligida por la pareja.**



La violencia contra la mujer es un problema **prevenible**.

La violencia contra la mujer está arraigada en la desigualdad de género.

Los programas orientados a reducir la violencia infligida por la pareja deben que combatir los factores de riesgo a muchos niveles.

Nivel

Factor de riesgo

Intervención

Individual



! **Antecedentes de violencia** en la infancia

Programas sobre la crianza de los hijos para prevenir el maltrato infantil



Relación



! **Control del hombre** sobre la mujer

Programas orientados a hombres jóvenes y niños para **promover actitudes y comportamientos equitativos** en materia de género



Comunidad



! **Normas que propician la desigualdad de género** y que toleren la violencia contra la mujer

Programas de promoción de **normas equitativas en materia de género** a través de los medios, la movilización de la comunidad, las escuelas y las instituciones religiosas



Social



! **Uso nocivo del alcohol** por la pareja masculina

Reducción de la disponibilidad y acceso al alcohol



! **Falta de acceso de la mujer a educación y empleo**

Leyes, políticas y programas que promuevan el acceso de la mujer al empleo y a microcréditos, así como el acceso de las jóvenes a la educación, y que prohíban la violencia contra la mujer





Pongamos fin a la violencia contra la mujer.

Funciones del sector de la salud:



Ofrecer

servicios de salud integrales a quienes sobreviven a la violencia



Reunir datos

sobre la prevalencia, los factores de riesgo y las repercusiones sanitarias



Fundamentar las políticas

orientadas a hacer frente a la violencia contra la mujer



Prevenir la violencia

fomentando y dando a conocer sobre los programas de prevención



Promover

el reconocimiento de la violencia contra la mujer como problema de salud pública



Material en la web

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/es/
<http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/en/>

Material de la OMS

OMS (2005). Multi-country study on women's health and domestic violence against women.
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/

OMS (2010). Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres: Qué hacer y cómo obtener evidencias.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/intimate/en/

OMS (2013). Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy guidelines.

